

### III етап Всеукраїнської олімпіади юних математиків

#### Умови та розв'язки по усіх класах

#### 1 тур

#### 7 клас

##### 1. (Фольклор)

Олеся записала натуральне число  $N$ . Після цього Андрійко записав одну шосту, одну п'яту, одну четверту, одну третю та одну другу від числа  $N$ . Виявилось, що сума усіх записаних чисел є цілим числом. Яке найменше число могла записати Олеся?

**Відповідь:** 20.

**Розв'язання.** Андрійко отримав таку суму:  $(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}) N = \frac{29N}{20}$ , а воно буде цілим за умови, що  $N$  ділиться на 20, тобто найменшим числом є число 20.

##### 2. (Фольклор)

До натурального числа  $N$  справа дописали дві різні ненульові цифри. Виявилось, що одержане число ділиться націло на  $N$ . При якому найбільшому  $N$  це можливо?

**Відповідь:** 98.

**Розв'язання.** Нехай справа дописати цифри, які утворюють число  $\overline{ab}$ . За умовою задачі випливає, що  $\overline{Nab} : N$ , або  $100N + \overline{ab} : N$ , звідки  $\overline{ab} : N$ . Оскільки число  $\overline{ab}$  утворене двома різними цифрами, то  $a \leq 98$ , тому й  $N \leq 98$ . А число  $N = 98$  задовольняє умову задачі. Дійсно, до числа 98 можна приписати цифри 9 та 8, і одержане число 9898 ділиться на 98, тобто воно задовольняє умову.

##### 3. (Рубльов Богдан)

а) Прямокутник  $ABCD$  розрізано на декілька квадратів, периметр кожного з яких дорівнює цілому числу сантиметрів. Чи обов'язково і периметр прямокутника  $ABCD$  також визначається цілим числом сантиметрів?

б) Квадрат  $ABCD$  розрізано на декілька квадратів, периметр кожного з яких дорівнює цілому числу сантиметрів. Чи обов'язково і периметр квадрата  $ABCD$  також визначається цілим числом сантиметрів?

**Розв'язання.** а) тут достатньо навести приклад. Розглянемо два квадрати  $ABMN$  та  $NMCD$  зі стороною  $\frac{1}{4}$ . Тоді периметр кожного з квадратів складає ціле число сантиметрів – 1, а от периметр прямокутника  $ABCD$  складає  $2 \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{3}{2}$  – не ціле число.

б) Розглянемо будь-яку сторону зовнішнього квадрату, до неї прилягають декілька менших квадратів (рис.1). Нехай сторона зовнішнього квадрату  $a$ , а сторони менших квадратів дорівнюють  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Тоді можемо записати, що сторона  $a$  дорівнює сумі сторін  $a = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , але кожна сторона  $a_i$ , якщо її помножити на 4, дає ціле, тому й периметр  $P$  квадрата  $ABCD$  є  $P = 4a = 4a_1 + 4a_2 + \dots + 4a_n$  – ціле число, оскільки оскільки кожний доданок є цілим.




Рис. 1

##### 4. (Чорний Максим)

Назвемо контуром чотири відрізки довжини 1, які обмежують квадрат  $1 \times 1$ . Автомат за одну операцію може пофарбувати будь-який контур. Яку найменшу кількість операцій повинен зробити автомат, щоб пофарбувати усі зовнішні та внутрішні лінії сітки прямокутника  $2010 \times 2011$ ?

Конттури, які фарбує автомат можуть мати спільні точки та відрізки, а також виходити за межі прямокутника.

**Відповідь:** 2025074.

**Розв'язання.** Зрозуміло, що кожний відрізок зовнішньої межі квадрату треба пофарбувати, а на це щонайменше потрібно  $2 \cdot 2011 + 2 \cdot 2010 - 4 = 8038$  операцій автомата (рис.2).

Треба також пофарбувати і внутрішній прямокутник розміром  $2008 \times 2009$ , що залишився, можливо без зовнішньої межі. Розіб'ємо усі квадрати внутрішнього прямокутника на доміно розміром  $1 \times 2$ . Внаслідок парності числа 2008 це завжди можна зробити. Тоді для фарбування одиничного відрізка, що розташований всередині доміно треба пофарбувати принаймні один з квадратів, які його утворюють.




Рис. 2

Як легко бачити, якщо ми застосуємо автомат до кожного чорного квадратика з кожного доміно (рис.3), то ми пофарбуємо усі потрібні лінії, оскільки кожна лінія внутрішнього прямокутника є межею деякого чорного квадратика. Загальна кількість доміно у прямокутнику дорівнює:  $\frac{2008 \cdot 2009}{2} = 2017036$ . Отже остаточно кількість операцій автомата:  $2017036 + 8038 = 2025074$ .




Рис. 3

### 3.1. (Фольклор)

Квадрат розрізаний на 4 однакових прямокутників та 1 квадрат, як це показано на рис.4. Відомо, що площа меншого квадрата дорівнює 16, а площа кожного прямокутника – 96. Визначіть сторони прямокутника.

**Відповідь:** Сторони прямокутника 8 та 12.

**Розв'язання.** Зрозуміло, що сторона внутрішнього квадрата дорівнює 4, а різниця сторін прямокутника і дорівнює стороні цього квадрата. Тому можемо позначити сторони прямокутника через  $x$  та  $x + 4$ . Площа великого прямокутника складає  $16 + 96 \cdot 4 = 400$ , тобто сторона 20. Легко побачити, що сторона великого квадрату складається з двох менших сторін прямокутника та сторони малого квадрата, тобто маємо для знаходження  $x$  так рівняння:  $2x + 4 = 20$ . Звідси менша сторона дорівнює  $x = 8$ , а більша сторона –  $x + 4 = 12$ .




Рис. 4

### 4.1. (Фольклор)

Є 10 куп камінців, у яких знаходиться відповідно 3, 4, 5, ..., 12 камінців. За один хід дозволяється обрати довільні три купки камінців та додати у першу 1 камінець, у другу – 2, у третю – 3 камінці, або обрати довільні три купки камінців та забрати з першої купки 1 камінець, з другої – 2, з третьої – 3 камінці, при умові, що у обраних купках є достатня кількість камінців.

Чи можна за скінченну кількість ходів одержати ситуацію, при якій у кожній купці знаходиться рівно по 2011 камінців?

**Відповідь:** Не можна.

**Розв'язання.** При таких операціях сумарна кількість камінців в усіх купках змінюється на число, що кратне 3. У кінцевий момент це число дорівнює  $2011 \cdot 10$  і не кратне 3. Але у початковий момент кількість камінців дорівнює  $3 + 4 + 5 + \dots + 12 = 75$ , тобто число кратне 3. Одержана суперечність показує неможливість такого перетворення.

## 8 клас

### 1. (Рубльов Богдан)

Відмінниці Олесі задали додому обчислити суму двох звичайних нескоротних дробів  $\frac{a}{b}$  і  $\frac{c}{d}$  (не обов'язково правильних). Її однокласник Андрійко хворів і перепитав це завдання телефоном, але не так почув і записав, що треба додати такі два дроби  $\frac{b}{a}$  і  $\frac{d}{c}$ . Коли він їх

додав, то запитав у Олесі відповідь. Виявилось, що відповіді співпали. Чи правильно додав свої дроби Андрійко, якщо Олеся одержала відмінну оцінку, а усі 4 дроби, що додавали Андрійко та Олеся, були попарно різними?

**Відповідь:** не правильно.

**Розв'язання.** Припустимо, що він додав їх правильно, тоді має місце рівність:  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{b}{a} + \frac{d}{c}$ , або  $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{bc+ad}{ac}$ . Звідси випливає, що  $bd = ac$ , тобто  $\frac{b}{a} = \frac{c}{d}$ , що суперечить тому, що усі чотири дроби різні.

## 2. (Фольклор)

Знайдіть усі цілі числа  $n$ , які задовольняють рівність:

$$(n - 1)(n - 3)(n - 5) \dots (n - 2011) = n(n + 2)(n + 4) \dots (n + 2010).$$

**Відповідь:** Таких цілих чисел не існує.

**Розв'язання.** Якщо замість  $n$  підставити парне число, то зліва число непарне, а справа – парне, і навпаки, якщо підставити непарне число, то зліва буде парне число, а справа – непарне, в обох випадках рівність неможлива.

## 3. (Різні задачі)

Числа  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  та  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  є перестановками чисел 1, 2, 3, 4, 5. Доведіть, що серед п'яти чисел  $a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, a_4b_4, a_5b_5$  принаймні два дають однакову остачу при діленні на 5.

**Розв'язання.** Без обмеження загальності будемо вважати, що  $a_5 = 5$ . Якщо при цьому  $b_5 \neq 5$ , то, наприклад,  $b_4 = 5$  і тоді числа  $a_4b_4$  та  $a_5b_5$  кратні 5, тому дають однакову нульову остачу при діленні на 5. у цьому випадку твердження доведене.

Нехай тепер  $b_5 = 5$ . Припустимо, що твердження задачі не вірне. Тоді числа  $a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, a_4b_4$  в деякому порядку дають остачі 1, 2, 3 та 4 при діленні на 5. Тоді з одного боку добуток чисел  $a_1b_1 \cdot a_2b_2 \cdot a_3b_3 \cdot a_4b_4$  дає при діленні на 5 остачу 4, що легко одержати, якщо розкрити дужки у рівності:  $(5n_1 + 1)(5n_2 + 2)(5n_3 + 3)(5n_4 + 4) = 5N + 24$ .

З іншого боку, оскільки числа  $a_1, a_2, a_3, a_4$  та  $b_1, b_2, b_3, b_4$  є перестановками чисел 1, 2, 3 та 4, то добуток  $a_1b_1 \cdot a_2b_2 \cdot a_3b_3 \cdot a_4b_4 = 24 \cdot 24 = 576$  дає при діленні на 5 остачу 1. Одержана суперечність завершує доведення.

## 4. (Веклич Богдан)

Нехай  $ABCD$  – вписаний чотирикутник. Позначимо середини сторін  $AB, BC, CD$  та  $DA$  через  $M, L, N$  та  $K$  відповідно. Виявилось, що  $\angle BMN = \angle MNC$ . Доведіть, що  $\angle DKL = \angle CLK$ .

Дивись розв'язання задачі 9-4.

## 5. (Анікушин Андрій – 13)

В космічному квадраті з діагоналлю  $A(0; 0)B(10; 10)$  космічний човен має доставити непоміченим секретний лист з точки  $A$  в точку  $B$ . Човну дозволяється рухатись таким чином: перебуваючи в точці  $(n_1; m_1)$ , де  $n_1, m_1$  – цілі числа однакової парності, переміститись по прямій у будь-яку точку  $(n_2; m_2)$ , де  $n_2 > n_1$ ,  $m_2 > m_1$  та цілі числа  $n_2, m_2$  також однакової парності. Вороги встановили радары, які дозволяють виявити човен. Зона покриття радарів показана стрілками на рисунку.




Рис. 5

Човен буде виявлений, якщо його траєкторія перетне зону дії радару (точка, у якій закінчується стрілка, не входить до зони покриття радару). Яких траєкторій руху космічного човна більше – тих, де човен буде виявлено чи тих, де човен помічено не буде?

**Відповідь:** траєкторій, де човен помічено не буде, більше.

**Розв'язання.** Додамо до відрізків, вздовж яких діє зона покриття радарів, ще низку вертикальних відрізків, щоб вони разом утворювали "сходи", як це показано на рис.6. Ці сходи розташовані у смугі між прямими  $x + y = 10$  та  $x + y = 11$ . Зрозуміло, що будь-яка траєкторія перетинає ці сходи. При цьому човен перетинає сходи рівно 1 раз, оскільки кожним своїм ходом він збільшує абсцису та ординату щонайменше на 1, тому їх сума збільшується принаймні на 2.

Назвемо траєкторію, на якій радар помітить човен, небезпечними, а усі інші – безпечними. Таким чином, якщо траєкторія перетинає сходи у точці, в якій діє радар, то це траєкторія, де його буде виявлено, тобто небезпечна, а якщо у точці поза зоною дії радару, то це траєкторія, де човен помічено не буде – небезпечна траєкторія.

Розглянемо дві групи траєкторій: ті, що проходять через точку  $(5, 5)$  і ті, що не проходять. Оскільки точка  $(5, 5)$  – поза зоною, то усі траєкторії, що проходять через цю точку, безпечні.

Разом з кожною траєкторією  $f(x)$  розглянемо також траєкторію  $g(x)$ , симетричну до  $f(x)$  відносно прямої  $AB$ . Тобто, якщо одна з траєкторій проходить через точку  $(a, b)$ , то інша траєкторія проходить через точку  $(b, a)$ .

Таким чином, якщо одна з цих двох траєкторій є небезпечною, тобто перетинає сходи у небезпечній точці  $(a, b)$ , то симетрична траєкторія проходить через точку  $(b, a)$ , яка є безпечною.

Це зрозуміло з таких міркувань. Якщо точка небезпечна та лежить всередині горизонтального відрізка, то симетрична їй точка лежить всередині вертикального відрізка сходів, тобто є безпечною. Якщо небезпечна точка є кінцем відрізка, то неважко їх перевернути і переконатись, що симетричні точки є безпечними.

Таким чином траєкторії другої групи розбиваються на пари і в кожній парі одна траєкторія безпечна, інша ні. Отже, загалом безпечних траєкторій більше.

#### 4.1. (Різні задачі)

У трикутнику  $ABC$  проведено медіани  $AL, BM, CN$ . Доведіть, що  $\angle ANC = \angle ALB$  тоді і тільки тоді, коли  $\angle ABM = \angle LAC$ .

**Розв'язання.** Проведемо середню лінію  $LN$ , тоді з паралельності прямих  $LN$  та  $AC$  випливає, що  $\angle NLA = \angle LAC$ . Таким чином, тепер треба показати таку рівносильність (рис.7):

$$\angle ANC = \angle ALB \Leftrightarrow \angle ABM = \angle NLA.$$

Позначимо точку перетину медіан трикутника  $ABC$  через  $G$ , тоді маємо такі рівносильні твердження.  $\angle ANC = \angle ALB \Leftrightarrow \angle BNC + \angle ALB = \pi \Leftrightarrow$  чотирикутник  $BNLG$  – вписаний  $\Leftrightarrow \angle ABM = \angle NLA$ , оскільки вони спираються на одну дугу.

Твердження доведено.

#### 5.1. (Різні задачі)

У селі 8 домів, між якими є доріжки, план яких зображений на рис.8. По кожній з цих доріжок дозволено рухатись лише в одному напрямі. Чи можна так установити напрямок руху по доріжках, щоб від будь-якого дома до будь-якого іншого дома можна було дістатись, пройшовши у дозволених напрямках не більше ніж по двох доріжках?

**Відповідь:** Не можна.




Рис. 6




Рис. 7





Рис. 8

**Розв'язання.** Розглянемо 4 хати, які на рис.9 позначені буквами  $A, B, C, D$ , між  $A$  та  $C$  існує рівно два шляхи, які мають не більше двох переходів. Через вершини  $B$  та  $D$  відповідно. Без обмежень загальності можемо вважати, що напрямок доріжок там обраний як на рис.9.

Є 2 шляхи від  $B$  до  $A$ , які містять не більше двох переходів – це прями напрямом, а також через вершину  $E$ . Оскільки прями напрямом вже йде у зворотному напрямі, то це визначає однозначно напрям по доріжках  $BE$  та  $EA$ . Аналогічно визначається напрям відрізків  $FA$  та  $FD$ . Розглянемо припустимі шляхи між  $F$  та  $B$ , а також між  $E$  та  $D$ . Обидва цих маршрути проходять вздовж доріжки  $FE$ , але вимагають протилежних напрямів. Одержжане доводить неможливість потрібної розстановки напрямів.



**Рис. 9**

## 9 клас

### 1. (Різні задачі)

Знайдіть усі значення параметра  $b$ , при яких для кожного  $x$  принаймні одна з функцій  $f_1(x) = x^2 + 2011x + b$  чи  $f_2(x) = x^2 - 2011x + b$  приймає додатне значення.

**Відповідь:**  $b > 0$ .

**Розв'язання.** При  $x = 0$  маємо  $f_1(0) = f_2(0) = b$ , тому значення  $b \leq 0$  умову не задовольняє.

Нехай тепер  $b > 0$ . Додамо значення обох квадратичних функцій і одержимо, що  $f_1(x) + f_2(x) = 2x^2 + 2b > 0$ , тому принаймні один з цих двох доданків буде додатним. Тобто кожне значення  $b > 0$  задовольняє умову.

### 2. (Фольклор)

Доведіть, що існує нескінченна кількість квадратів натуральних чисел, які можна подати у вигляді  $2^n + 2^m$ , де  $n, m$  – деякі різні натуральні числа.

**Розв'язання.** Покладемо  $n = m + 3$ , тоді  $N = 2^n + 2^m = 2^m(2^3 + 1) = 2^m \cdot 9$ , тепер достатньо вибрати  $m = 2s$  і будемо мати, що  $N = (3 \cdot (2^s))^2$  – квадрат для довільного натурального  $s$ .

### 3. (Рубльов Богдан)

У волейбольній першості 8 команд грають в одне коло, кожна з кожною рівно 1 раз. За перемогу нараховується 1 очко, за поразку – 0 очок, нічиїх у волейболі не буває. Якщо по завершенню турніру різниця очок команд, що посіли перше та друге місця, не перевищує 1 очка, між командами проводиться стикова гра. За аналогічних умов стикові ігри проводяться між командами, що посіли 3-є та 4-е, 5-е та 6-е, а також 7-е та 8-е місця. Таким чином максимум може бути проведено 4 стикові гри. Яка найменша кількість стикових ігор може бути проведена по завершенню турніру?

**Зауваження.** По завершенню турніру при будь-яких результатах кожне місце займає рівно одна команда. Навіть якщо у декількох команд рівна кількість очок, вони займають різні місця.

**Відповідь:** 1.

**Розв'язання.**

Якщо припустити, що не було проведено жодної стикової гри, то різниця між 1-м та 2-м місцем, 3-м та 4-м, 5-и та 6-м, а також 7-м та 8-м місцем складає не менше ніж 2 очки. Тоді різниця між 1-м місцем та 8-м складає мінімум 8 очок, але переможець може набрати максимум 7 очок (усі перемоги), а остання команда – 0 очок (усі поразки), але навіть тоді різниця не перевищує 7 очок. Одержжали суперечність. Таким чином принаймні 1 стикова гра була проведена.

Залишилось навести приклад, коли треба провести лише 1 стиковий матч, наприклад, команди зіграли таким чином, як це показано у таблиці:

1місце	X	1	1	1	1	1	1	1	= 7
2місце	0	X	0	1	1	1	1	1	= 5
3місце	0	1	X	0	0	1	1	1	= 4
4місце	0	0	1	X	1	0	1	1	= 4
5місце	0	0	1	0	X	1	1	1	= 4
6місце	0	0	0	1	0	X	0	1	= 2
7місце	0	0	0	0	0	1	X	1	= 2
8місце	0	0	0	0	0	0	0	X	= 0

#### 4. (Веклич Богдан)

Нехай  $ABCD$  – вписаний чотирикутник. Позначимо середини сторін  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  та  $DA$  через  $M$ ,  $L$ ,  $N$  та  $K$  відповідно. Виявилось, що  $\angle BMN = \angle MNC$ . Доведіть, що:

а)  $\angle DKL = \angle CLK$ ;

б) у чотирикутнику  $ABCD$  є пара паралельних сторін.

**Розв'язання.** а) З властивостей середніх ліній та вписаних кутів маємо, що  $KM \parallel BD$ ,  $KN \parallel AC$ ,  $\angle ABD = \angle ACD \Rightarrow \angle AMK = \angle ABD = \angle ACD = \angle KND$ . Тому  $\angle KMN = \pi - \angle AMK - \angle BMN = \pi - \angle KND - \angle MNC = \angle KNM$ , тобто  $\triangle KMN$  рівнобедрений, тому  $KM = KN$ , звідси чотирикутник  $KMLN$  – ромб, тому  $\angle NKL = \angle NLK$  (Рис.10). Оскільки аналогічно маємо, що  $\angle AMK = \angle KND$ ,  $\angle DKN = \angle NLC$ , тому  $\angle KLD = \angle DKN + \angle NKL = \angle NLC + \angle LNK = \angle CLK$ , що завершує доведення пункта а).




Рис. 10

б) Оскільки  $KM = KN$ , то  $DB = 2KM = 2KN = AC$ , але тоді або  $\angle ABC + \angle DAB = \pi$ , тоді  $DA \parallel BC$ , або  $\angle ABC = \angle DAB$  – кути спираються на рівні хорди або рівні, або доповнюють один інший до розгорнутого кута. Але тоді, оскільки  $\angle DAC = \angle DBC$ , то  $\angle CAB = \angle DAB - \angle DAC = \angle ABC - \angle DBC = \angle ABD = \angle ACD$ , але звідси випливає, що  $AB \parallel BC$ .

#### 5. (Сенін Віталій)

Для невід'ємних чисел  $a, b, c$ , що задовольняють умову  $a^2b + b^2c + c^2a \leq a + b + c$ , доведіть нерівність:

$$ab + bc + ca \leq a + b + c.$$

**Розв'язання.** Запишемо нерівність Коші-Буняковського для наборів чисел  $(a_1, a_2, a_3)$  та  $(b_1, b_2, b_3)$ :

$$a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2},$$

або

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

Підберемо такі набори:  $(a_1 = a\sqrt{b}, a_2 = b\sqrt{c}, a_3 = c\sqrt{a})$  та  $(b_1 = \sqrt{b}, b_2 = \sqrt{c}, b_3 = \sqrt{a})$ . Тоді будемо мати

$$(ab + bc + ca)^2 \leq (a^2b + b^2c + c^2a)(a + b + c) \leq (a + b + c)^2,$$

звідки й випливає потрібна нерівність.

#### 4.1. (Різні задачі)

Трикутник  $ABC$  вписаний в коло. В точках  $A$  та  $B$  проведені дотичні до цього кола, які перетинаються в точці  $T$ . Пряма, проведена через точку  $T$  паралельно стороні  $AC$ , перетинає сторону  $BC$  у точці  $D$ . Доведіть, що  $AD = CD$ .

**Розв'язання.** З того, що трикутник  $ATB$  рівнобедрений, та кути  $\angle TBA$  та  $\angle BCA$  спираються на одну дугу, маємо рівність:

$$\angle TBA = \angle TAB = \angle BCA = \angle BDT.$$

Звідси випливає, що чотирикутник  $BTAD$  вписаний (рис.11). Тому  $\angle BTA = \angle ADC$ . Таким чином за двома кутами подібні трикутники  $ABT$  та  $ACD$ . А оскільки трикутник  $ATB$  рівнобедрений, то рівнобедреним також є  $\triangle ACD$ . Звідси вже знаходимо, що  $AD = CD$ .




Рис. 11

#### 5.1. (Торба С., Клурман О., Рубльов Б.)

Для невід'ємних чисел  $a, b, c$ , сума яких не перевищує 2, доведіть нерівність

$$ab(a^2 + b^2) + bc(b^2 + c^2) + ca(c^2 + a^2) \leq 8.$$

Чи може в цій нерівності досягатись рівність?

**Відповідь:** Рівність досягатись не може.

**Розв'язання.** Оскільки  $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq 1$ . Застосуємо цю оцінку для кожної пари змінних, і ми одержимо, що нам треба довести таку нерівність:

$$a^2 + b^2 + c^2 \leq 4.$$

Остання нерівність очевидна, оскільки для додатних чисел маємо, що

$$a^2 + b^2 + c^2 \leq (a + b + c)^2 = 4.$$

Рівність досягатись не може, оскільки у першій оцінці виконується рівність за умов  $a = b$ , тому це вимагає рівності усіх змінних, але при умові  $a = b = c$  рівність очевидно не виконується.

### 10 клас

#### 1. (Фольклор)

Олеся записує в кожній вершині правильної трикутної призми одне з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. Андрійко записує на кожному ребрі число, що є сумою чисел, записаних Олесяю на кінцях цього ребра. Чи може Олеся записати числа так, щоб усі числа, які запише Андрійко, виявились різними?

**Відповідь:** Можна. Один з прикладів, як можна розставити числа по вершинах, щоб задовольнити умови показаний на рис.12.




Рис. 12

#### 2. (Фольклор)

Відомо, що  $x_1, x_2, x_3$  – попарно різні дійсні числа.

а) Числа  $x_2, x_3$  є нулями функції  $f_1(x) = x^2 + p_1x + q_1$ ; числа  $x_3, x_1$  є нулями функції  $f_2(x) = x^2 + p_2x + q_2$ ; числа  $x_1, x_2$  є нулями функції  $f_3(x) = x^2 + p_3x + q_3$ . Чи обов'язково функція  $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$  має нулі?

б) Числа  $x_2, x_3$  є нулями функції  $f_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ ; числа  $x_3, x_1$  є нулями функції  $f_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$ ; числа  $x_1, x_2$  є нулями функції  $f_3(x) = a_3x^2 + b_3x + c_3$ . Чи обов'язково функція  $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$  має нулі?

**Відповідь:** а) обов'язково; б) не обов'язково.

**Розв'язання.** а) Запишемо цю функцію у такому вигляді  $f(x) = (x - x_2)(x - x_3) + (x - x_1)(x - x_3) + (x - x_1)(x - x_2)$ , очевидно, що графіком цієї функції є парабола, яка має гілки, що направлені вгору. Без обмеження загальності можемо вважати, що  $x_1 < x_2 < x_3$ . Тоді  $f(x_2) = (x_2 - x_1)(x_2 - x_3) < 0$ , що рівносильне тому, що у параболі є корені.


б) Розглянемо приклади таких функцій:  $f_1(x) = x^2 + x$ ,  $f_2(x) = x^2 - x$ ,  $f_3(x) = 1 - x^2$ , вони мають корені 0, -1, 0, 1 та -1, 1 відповідно. Їх сума – це функція  $f(x) = x^2 + x + x^2 - x + 1 - x^2 = x^2 + 1$ , яка очевидно нулів не має.

### 3. (Рожкова Марія)

На площині нарисована трапеція  $ABCD$  з основами  $BC = a$  та  $AD = 2a$ . Користуючись лише лінійкою, побудуйте трикутник, площа якого дорівнює площі трапеції.

За допомогою лінійки можна проводити прямі через дві відомі точки.

**Розв'язання.** За допомогою лінійки побудуємо точку перетину діагоналей трапеції  $O$ , а також точку перетину продовжень бокових сторін  $T$ . Добре відомо, що на прямій  $OT$  лежать середини основ  $P$  та  $E$  (рис.13). Тоді за умовою  $AE = ED = BC = a$ . Тому  $ABCE$  та  $BCDE$  – паралелограми, їх точки перетину діагоналей – це точки  $M$  та  $N$  відповідно. Таким чином можна провести пряму  $MN$  – середню лінію трапеції, яка перетинає бічні сторони в точках  $K$  та  $L$  відповідно. Тепер проведемо пряму  $BL$ , яка перетинає пряму  $AD$  у точці  $F$ . Тоді  $\triangle ABF$  – шуканий, оскільки  $\triangle ABF = \triangle BCL$ .



**Рис. 13**

### 4. (Фольклор)

Задане число  $n = 11^{2011} \cdot 2011^{11}$ . Скільки існує натуральних дільників числа  $n^2$ , які менші від  $n$ , але не є дільниками  $n$ ?

**Відповідь:** 22121.

**Розв'язання.** Спочатку підрахуємо кількість  $N$  дільників числа  $n^2 = 11^{4022} \cdot 2011^{22}$  за відомою формулою:

$$N = (4022 + 1)(22 + 1) = 92529.$$

Оскільки усі дільники числа  $n^2$  можна розбити на пари –  $d$  та  $\frac{n^2}{d}$ , одне з яких більше від числа  $n$ , а інше – менше. Саме число  $n$ , як дільник  $n^2$ , не має пари та не є меншим від  $n$ , то кількість дільників числа  $n^2$ , які менші від  $n$  дорівнює  $\frac{92529-1}{2} = 46264$ .

Тепер серед усіх цих дільників треба вилучити ті, які є дільниками числа  $n$ . Зрозуміло, що вони усі менші від  $n$  (саме число  $n$  не треба рахувати серед дільників числа  $n$ , оскільки ми його не враховували перед цим серед дільників числа  $n^2$ , що є меншими від  $n$ ).

Кількість  $N_1$  дільників числа  $n$ , що менші від  $n$ , обчислимо за аналогічною формулою:

$$N_1 = (2011 + 1)(11 + 1) - 1 = 24143.$$

Таким чином шукане число дільників дорівнює  $46264 - 24143 = 22121$ .

### 5. (Торба С., Клурман О., Рубльов Б.)

Для невід'ємних чисел  $a, b, c$ , сума яких не перевищує 2, доведіть нерівність

$$ab(a^2 + b^2) + bc(b^2 + c^2) + ca(c^2 + a^2) \leq 2.$$

Чи може в цій нерівності досягатись рівність?



**Відповідь:** Рівність досягатись може.

**Розв'язання.** Очевидно, що достатньо цю нерівність довести для невід'ємних чисел, що задовольняють рівність  $a + b + c = 2$ .

Позначимо через  $x = ab + bc + ac$ , тоді

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ac) = 4 - 2(ab + bc + ac) = 2(2 - x).$$

Далі з відомої нерівності  $x(2 - x) \leq 1$  маємо, що

$$\begin{aligned} 2 + 2abc &\geq 2 \geq 2x(2 - x) = (ab + bc + ac)(a^2 + b^2 + c^2) = \\ &= ab(a^2 + b^2) + cb(c^2 + b^2) + ac(a^2 + c^2) + abc(a + b + c), \end{aligned}$$

з якої, після скорочення рівних виразів  $2abc = abc(a + b + c)$ , маємо потрібну нерівність.

Рівність може досягатись, наприклад, при  $a = b = 1, c = 0$ .

#### 4.1. (Різні задачі)

Числа  $a_1, a_2, \dots, a_{11}$  та  $b_1, b_2, \dots, b_{11}$  є перестановками чисел  $1, 2, \dots, 11$ . Доведіть, що серед 11 числа  $a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_{11}b_{11}$  принаймні два мають однакову остачу при діленні на 11.

**Розв'язання.** Без обмеження загальності будемо вважати, що  $a_{11} = 11$ . Якщо при цьому  $b_{11} \neq 11$ , то, наприклад,  $b_1 = 11$  і тоді числа  $a_1b_1$  та  $a_{11}b_{11}$  кратні 11, тому дають однакову нульову остачу при діленні на 11. у цьому випадку твердження доведене.

Нехай тепер  $b_{11} = 11$ . Методом від супротивного, припустимо, що немає двох рівних остач у зазначених чисел. Тоді числа  $a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_{10}b_{10}$  дають у деякому порядку остачі  $1, 2, \dots, 10$  при діленні на 11. Тоді з одного боку добуток чисел

$$a_1b_1 \cdot a_2b_2 \cdot \dots \cdot a_{10}b_{10} \equiv 10! \pmod{11}.$$

З іншого боку, оскільки числа  $a_1, a_2, \dots, a_{10}$  та  $b_1, b_2, \dots, b_{10}$  є перестановками чисел  $1, 2, \dots, 10$ , то добуток

$$a_1b_1 \cdot a_2b_2 \cdot \dots \cdot a_{10}b_{10} \equiv (10!)^2 \pmod{11}.$$

Таким чином числа  $10!$  та  $(10!)^2$  дають однакові остачі при діленні на 11. Але

$$10! \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 10 \equiv -1 \pmod{11},$$

а  $(10!)^2 \equiv 1 \pmod{11}$ , Одержана суперечність завершує доведення.

Зауваження. Останнє твердження легко показати за теоремою Вільсона.

#### 5.1. (Торба С., Клурман О., Рубльов Б.)

Для невід'ємних чисел  $a, b, c$ , сума яких не перевищує 2, доведіть нерівність

$$ab(a^2 + b^2) + bc(b^2 + c^2) + ca(c^2 + a^2) \leq 6.$$

Чи може в цій нерівності досягатись рівність?

**Відповідь:** Рівність досягатись не може.

**Розв'язання.** Оскільки  $a + b \leq 2$ , покажемо, що для  $a + b = 2$  виконується нерівність:

$$ab(a^2 + b^2) \leq 2.$$

Дійсно, підставимо  $b = 2 - a$  і одержимо, що  $ab(a^2 + b^2) = a(2 - a)(a^2 + (2 - a)^2) = (2a - a^2)(2a^2 - 4a + 4) = 2(2a - a^2)(2 - (2a - a^2)) = 2t(2 - t) \leq 2$ , що легко випливає з нерівності  $2t - t^2 \leq 1 \Leftrightarrow (t - 1)^2 \geq 0$ . Далі застосуємо одержану нерівність для кожного з трьох доданків, тоді кожний з них не перевищує 2, тому остаточно ліва частина не перевищує 6.

Рівність не може досягатись, бо вона можлива, коли кожний з трьох доданків дорівнює двом, а це можливо лише за умови  $a = b = c = 1$ , що неможливо.

**1. (Мисак Данило)**

Розв'язати рівняння  $[x^2] - 2x + 1 = 0$ , де через  $[x^2]$  позначено найбільше ціле число, що не перевищує  $x^2$ .

**Відповідь:**  $x = 1$ ,  $x = \frac{1}{2}$  або  $x = \frac{3}{2}$ .

**Розв'язання.** Перенесемо  $2x$  у праву частину та поділимо на 2. Матимемо, що  $x = \frac{[x^2]+1}{2}$ . Отже,  $x$  — напівціле число, і або  $x = t$ , або  $x = t + \frac{1}{2}$ , де  $t$  — деяке ціле число. Якщо  $x = t$ , маємо, що  $[x^2] - 2x + 1 = [t^2] - 2t + 1 = t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Leftrightarrow x = 1$ . Якщо ж  $x = t + \frac{1}{2}$ , то  $[x^2] - 2x + 1 = [(t + \frac{1}{2})^2] - 2(t + \frac{1}{2}) + 1 = [t^2 + t + \frac{1}{4}] - 2t - 1 + 1 = t^2 + t - 2t = t^2 - t = t(t - 1) = 0 \Leftrightarrow t = 0$  або  $t = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$  або  $x = \frac{3}{2}$ .

**2. (Фольклор)**

Знайдіть усі натуральні числа  $a$  і  $b$ , різниця яких дорівнює 2011, а добуток — точний квадрат натурального числа.

**Відповідь:**  $(\frac{2011+1}{2})^2 = 1012036$  та  $(\frac{2011-1}{2})^2 = 1010025$ .

**Розв'язання.** Оскільки  $a - b = 2011$ , а число 2011 — просте, то НСД шуканих чисел  $(a, b)$  є дільником простого числа 2011, тому це буде або 1, або 2011.

1 випадок. Якщо  $(a, b) = 1$ , тобто числа взаємно прості, то кожне з них повинне бути квадратом цілого числа. Позначимо відповідно  $a = c^2$ ,  $b = d^2$ , тоді маємо, що  $a - b = c^2 - d^2 = (c - d)(c + d) = 2011 = 1 \cdot 2011$ , звідки маємо систему рівнянь  $\begin{cases} c - d = 1, \\ c + d = 2011. \end{cases}$  З цієї системи рівнянь знаходимо, що  $c = \frac{2011+1}{2} = 1006$  та  $d = \frac{2011-1}{2} = 1005$ , звідки й маємо наведену відповідь.

2 випадок. Якщо  $(a, b) = 2011$ , то  $a = 2011c$ ,  $b = 2011d$ , де  $(c, d) = 1$ . Тоді  $ab = 2011^2 cd$ , звідки випливає, що  $c = e^2$ ,  $d = f^2$  — точні квадрати натуральних чисел. Але тоді  $a - b = 2011(c - d) = 2011$ , тобто  $c - d = (e - f)(e + f) = 1$ , що для точних квадратів неможливо.

**3. (Фольклор)**

Є 2012 куп камінців. Перша з них містить  $2^0$  камінців, друга містить  $2^1$  камінців, третя —  $2^2$  камінців, і так далі. 2012 купка містить  $2^{2011}$  камінців. За один хід дозволяється обрати довільні три купки камінців та додати у першу 2 камінці, у другу — 3, у третю — 4 камінці, або обрати довільні три купки камінців та забрати з першої купки 2 камінці, з другої — 3, з третьої — 4 камінці, при умові, що у обраних купках є достатня кількість камінців.

Чи можна за скінченну кількість ходів одержати ситуацію, при якій у кожній купці знаходиться рівно по  $3^{1005}$  камінців?

**Відповідь:** Не можна.

**Розв'язання.** При таких операціях сумарна кількість камінців в усіх купках змінюється на число, що кратне 9. У кінцевий момент це число дорівнює  $2012 \cdot 3^{1005}$  і також кратне 9. Але у початковий момент кількість камінців дорівнює

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2011} = 2^{2012} - 1.$$

Знайдемо остачу при діленні цього числа на 9.  $2012 = 335 \cdot 6 + 2$ ,  $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$ , тому

$$2^{2012} - 1 \equiv (2^6)^{335} \cdot 2^2 - 1 \equiv 4 - 1 = 3 \pmod{9}.$$

Тобто це число на 9 не ділиться, звідки й випливає неможливість.

**4. (Ясинський Вячеслав — 23)**

На діагоналях  $AC$  і  $BD$  вписаного чотирикутника  $ABCD$  відмітили точки  $X$  і  $Y$  відповідно так, що чотирикутник  $ABXY$  є паралелограмом. Доведіть, що описані кола трикутників  $BXD$  та  $CYA$  мають рівні радіуси.

**Розв'язання.** Оскільки чотирикутник  $ABCD$  — вписаний, то  $\angle ABD = \angle ACD$ , як вписані, що спираються на одну і ту ж саму дугу  $\smile AD$ . Крім того,  $\angle ABD = \angle ABY =$

$\angle BYX$ , як внутрішні різносторонні при паралельних  $AB$  і  $XY$  та січній  $BY$ . Отже, чотирикутник  $CXYD$  – вписаний в коло, бо  $\angle XCD = \angle XYB$  (рис.14).

З того, що чотирикутник  $CXYD$  – вписаний, випливає, що  $\angle XCY = \angle XDY$ , як вписані, що спираються на одну і ту ж саму дугу  $\smile XY$ . З рівності цих кутів випливає, що  $\sin \angle ACY = \sin \angle BDY$ . Крім того,  $BX = AY$ , як протилежні сторони паралелограма. За теоремою синусів з трикутників  $BXD$  і  $CAY$  знаходимо:

$$R_{BDX} = \frac{BX}{2 \sin \angle BDY} = \frac{AY}{2 \sin \angle ACY} = R_{CAY},$$

що і треба було довести.




Рис. 14

### 5. (Рибак Олександр)

Нехай  $P(x)$  – многочлен з цілими коефіцієнтами. Відомо, що для деякого цілого  $a$  існує натуральне число  $n$  таке, що  $\underbrace{P(P(\dots P(a) \dots))}_n = a$ . Доведіть, що для цього  $a$  також

виконується умова  $P(P(a)) = a$ .

**Розв'язання.** Визначимо послідовність  $(a_i)$  таким чином:  $a_0 = a$ ,  $a_i = P(a_{i-1})$  для усіх натуральних  $i$ . Розглянемо найменше натуральне  $m$ , для якого існує таке натуральне  $j < m$ , що має місце рівність  $a_j = a_m$ . З умови задачі випливає, що таке значення існує. З того, що ми вибрали найменше  $m$  випливає, що  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$  – попарно різні.

Покажемо тоді, що  $j = 0$ . Якщо це не так, то послідовність буде мати такий вигляд:

$$a_0, a_1, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_{m-1}, a_m = a_j, a_{j+1}, \dots, a_{m-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_{m-1}, a_j, a_{j+1}, \dots,$$

і число, що дорівнює  $a_0$  у цій послідовності більше не зустрінеться, що суперечить умові.

Отже  $a_0 = a_m$ , і ця послідовність є  $m$ -періодичною, тобто  $a_p = a_q$  тоді і тільки тоді, коли  $p - q : m$ .

Нехай серед чисел  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$  найбільшим є  $a_l$ , а найменшим є  $a_k$ . Якщо  $a_l = a_k$ , тобто усі члени послідовності рівні, то  $m = 1$  і відповідно  $P(a) = a$  звідки й  $P(P(a)) = a$ .

Нехай тепер  $a_l > a_k$ , з того, що коефіцієнти многочлен – цілі, усі члени послідовності також цілі. Тому  $P(a_l) - P(a_k)$  ділиться на  $a_l - a_k$ , але значення  $P(a_l), P(a_k)$  – також члени послідовності, звідки випливає, що  $|P(a_l) - P(a_k)| \leq |a_l - a_k|$ , тому різниця  $P(a_l) - P(a_k)$  може дорівнювати або 0, або  $\pm(a_l - a_k)$ .

Якщо  $P(a_l) - P(a_k) = a_l - a_k$ , то різниця між членами послідовності така сама, як між найбільшим та найменшим, тобто вони зберігають свої значення, тому  $P(a_k) = a_k$ , звідки знову маємо, що  $m = 1$  та  $a_l = a_k$ .

Якщо  $P(a_l) - P(a_k) = 0$ , тобто  $a_{l+1} = P(a_l) = P(a_k) = a_{k+1}$ , два члени послідовності рівні, тому  $(l+1) - (k+1) = l - k$  ділиться на  $m$ , звідки знову випливає, що  $l = k$  та  $m = 1$ .

Якщо  $P(a_l) - P(a_k) = -(a_l - a_k)$ , то це можливо лише за умови, що  $P(a_l) = a_k$ ,  $P(a_k) = a_l$ , оскільки різниця між такими членами послідовності  $P(a_k) - P(a_l) = a_l - a_k$  – максимальна можлива, що може бути лише при вказаній умові. Таким чином  $P(a_l) = a_k$ ,  $P(a_k) = a_l$ , а це означає, що  $m = 2$ , звідки й випливає, що  $m = 2$ , що тягне за собою  $P(P(a)) = a$ .

#### 4.1. (Різні задачі)

Всередині паралелограма  $ABCD$  розташовані кола  $\gamma_1$  та  $\gamma_2$ , які дотикаються зовнішнім чином у точці  $K$ . Коло  $\gamma_1$  дотикається до сторін  $AD$  та  $AB$  паралелограма, а коло  $\gamma_2$  дотикається до сторін  $CD$  та  $CB$ . Доведіть, що точка  $K$  лежить на діагоналі  $AC$  паралелограма.

**Розв'язання.** Позначимо центри кіл відповідно через  $O_1, O_2$  (рис.15). Розглянемо гомотетію  $H_K^k(\gamma_1)$  з центром в точці  $K$  і коефіцієнтом  $k = -\frac{KO_2}{KO_1}$ . Тоді коло  $\gamma_1$  переходить у коло  $\gamma_2$ , дотичні  $AD$  та  $AB$  до кола  $\gamma_1$  переходять відповідно у дотичні  $CB$  та  $CD$  до кола  $\gamma_2$ . Таким чином і точка перетину першої пари дотичних - вершина  $A$  переходить при зазначеній гомотетії у точку перетину іншої пари дотичних, тобто у вершину  $C$ . Звідси випливає, що центр гомотетії  $K$  розташований на прямій  $AC$ , що й треба було довести.




Рис. 15

#### 5.1. (Різні задачі)

Знайдіть усі функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , які задовольняють такі дві умови:

1) для усіх дійсних чисел  $x, y$  виконується рівність

$$f(2x) = f(x+y)f(y-x) + f(x-y)f(-x-y).$$

2)  $f(x) \geq 0$  для усіх дійсних  $x$ .

**Відповідь:**  $f \equiv 0$  та  $f \equiv \frac{1}{2}$ .

**Розв'язання.** Підставимо у задану рівність  $x = y$  і одержимо, що для усіх дійсних  $x$  справджується рівність:

$$f(2x) = f(0)f(2x) + f(0)f(-2x). \quad (1)$$

Тепер у рівність (1) підставимо  $x = 0$  і будемо мати, що  $f(0) = 2f^2(0)$ . Звідси маємо дві можливості:  $f(0) = 0$  та  $f(0) = \frac{1}{2}$ .

Якщо  $f(0) = 0$ , то з рівності (1) маємо, що для усіх дійсних  $x$  маємо  $f(2x) = 0$ , тобто  $f \equiv 0$ .

Якщо  $f(0) = \frac{1}{2}$ , то з рівності (1) маємо, що  $f(2x) = \frac{1}{2}f(2x) + \frac{1}{2}f(-2x)$ , або  $f(2x) = f(-2x)$ , тобто функція - парна.

Покладемо тепер у початкову рівність  $x = 0$ , тоді внаслідок парності функції маємо, що

$$\frac{1}{2} = f(0) = (f(y))^2 + (f(-y))^2 = 2(f(y))^2.$$

Звідси знаходимо остаточно, що  $f \equiv \frac{1}{2}$ .

Перевіркою переконуємось, що обидві задані розв'язки задовольняють умови.